

# Material de Farmacovigilancia



Paxlovid® está indicado para el tratamiento de COVID-19 en adultos que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de progresión a COVID-19 grave.<sup>1,2</sup>

\*No aprobado para menores de 18 años.<sup>1,2</sup>

Paxlovid® (Nirmatrelvir/Ritonavir) no es preventivo y se requiere prueba positiva para su uso.

Paxlovid® está contraindicado en pacientes: <sup>1,2</sup>

- Con antecedentes de hipersensibilidad clínicamente significativa a los principios activos (PF-07321332/ritonavir) o a alguno de los excipientes de la fórmula.
- Con insuficiencia hepática grave.
- Con insuficiencia renal grave.



## ¿Cómo tomar Paxlovid® (Nirmatrelvir/Ritonavir)? <sup>1,2</sup>

Siempre tome este medicamento exactamente como su médico lo indique. Tomar el tratamiento Paxlovid® (Nirmatrelvir/Ritonavir), por vía oral, cada 12 horas, durante 5 días.<sup>1,2</sup>

Es importante que trague las tabletas enteras; no las parta, no las mastique, ni las triture.<sup>1,2</sup>

### Dosis matutina<sup>1,2</sup>



- Dos tabletas de color rosa de 150 mg de Nirmatrelvir
- Una tableta blanca de 100 mg de Ritonavir


Debe tomar las 3 tabletas en una sola toma

### Dosis nocturna<sup>1,2</sup>



- Dos tabletas de color rosa de 150 mg de Nirmatrelvir
- Una tableta blanca de 100 mg de Ritonavir

Debe tomar las 3 tabletas en una sola toma



## Posibles efectos adversos<sup>1,2</sup>

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir reacciones adversas. **Las reacciones adversas a medicamentos son efectos no deseados de un medicamento, aunque no todas las personas los sufran**, dentro de los más frecuentes se encuentran:

- Sentido del gusto alterado;
- Diarrea;
- Vómitos;
- Dolor de cabeza.

## Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia: <sup>1,2</sup>

Embarazo: No hay datos sobre el uso de Paxlovid® en mujeres embarazadas. No se recomienda Paxlovid® durante el embarazo ni en mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos eficaces

Lactancia: No hay datos en humanos sobre el uso de Paxlovid® en la lactancia.

## Precauciones Generales: <sup>1,2</sup>

Riesgo de reacciones adversas graves debido a interacciones con otros medicamentos. El inicio del tratamiento con Paxlovid®, un inhibidor de CYP3A, en pacientes que reciben medicamentos metabolizados por CYP3A o el inicio de medicamentos metabolizados por CYP3A en pacientes que ya reciben Paxlovid®, puede aumentar las concentraciones plasmáticas de medicamentos metabolizados por CYP3A. El inicio de los medicamentos que inhiben o inducen el CYP3A puede aumentar o disminuir las concentraciones de Paxlovid®, respectivamente.

En caso de presentar alguna reacción o sospecha de presentar alguna reacción adversa puede comunicarlo a:



### Contacto Unidad de Farmacovigilancia

Sitio web: [www.pfizersafetyreporting.com](http://www.pfizersafetyreporting.com)

Correo: [mex.aereporting@pfizer.com](mailto:mex.aereporting@pfizer.com) o

Número de teléfono: 800 401 2002

Consulte a su médico.

Para mayor información consulte: <https://www.paxlovideducacion.mx>

PP-C1D-MEX-0172

Referencias:

1. Información para prescribir del producto (Nirmatrelvir/Ritonavir). CDS 21/FEB/23 - 22/Mar/23 - Versión 10.0 & 11.0

2. Información para prescribir PAXLOVID®. Pfizer 2022 LLD\_Mex\_SPC\_GB\_31Dic2021\_v3.