


Material de Farmacovigilancia



Paxlovid® está indicado para el tratamiento de COVID-19 en adultos que no requieren oxígeno suplementario y que tienen un mayor riesgo de progresión a COVID-19 grave.¹

*No aprobado para menores de 18 años.¹

Paxlovid® (Nirmatrelvir/Ritonavir) no es preventivo.

Paxlovid® está contraindicado, entre otros, en pacientes:¹

- Con antecedentes de hipersensibilidad clínicamente significativa a los principios activos (nirmatrelvir/ritonavir) o a alguno de los excipientes de la fórmula.
- Con insuficiencia hepática grave.
- Con insuficiencia renal grave.



¿Cómo tomar Paxlovid® (Nirmatrelvir/Ritonavir)?¹

Siempre tome este medicamento exactamente como su médico lo indique. Tomar el tratamiento Paxlovid® (Nirmatrelvir/Ritonavir), por vía oral, cada 12 horas, durante 5 días.¹

Es importante que trague las tabletas enteras; no las parta, no las mastique, ni las triture.¹

Dosis matutina¹



- Dos tabletas de color rosa de 150 mg de Nirmatrelvir
- Una tableta blanca de 100 mg de Ritonavir


Debe tomar las 3 tabletas en una sola toma

Dosis nocturna¹



- Dos tabletas de color rosa de 150 mg de Nirmatrelvir
- Una tableta blanca de 100 mg de Ritonavir

Debe tomar las 3 tabletas en una sola toma



Posibles efectos adversos¹

Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir reacciones adversas. **Las reacciones adversas a medicamentos son efectos no deseados de un medicamento, aunque no todas las personas los sufran**, dentro de los más frecuentes se encuentran:

- Sentido del gusto alterado;
- Diarrea;
- Vómitos;
- Dolor de cabeza.

Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia:¹

Embarazo: No hay datos sobre el uso de Paxlovid® en mujeres embarazadas. No se recomienda Paxlovid® durante el embarazo ni en mujeres en edad fértil que no utilicen métodos anticonceptivos eficaces

Lactancia: No hay datos en humanos sobre el uso de Paxlovid® en la lactancia.

Precauciones Generales:¹

Riesgo de reacciones adversas graves debido a interacciones con otros medicamentos. El inicio del tratamiento con Paxlovid®, un inhibidor de CYP3A, en pacientes que reciben medicamentos metabolizados por CYP3A o el inicio de medicamentos metabolizados por CYP3A en pacientes que ya reciben Paxlovid®, puede aumentar las concentraciones plasmáticas de medicamentos metabolizados por CYP3A. El inicio de los medicamentos que inhiben o inducen el CYP3A puede aumentar o disminuir las concentraciones de Paxlovid®, respectivamente.

En caso de presentar alguna reacción o sospecha de presentar alguna reacción adversa puede comunicarlo a:



Contacto Unidad de Farmacovigilancia
Sitio web: www.pfizersafetyreporting.com
Correo: mex.aereporting@pfizer.com o
Número de teléfono: 800 401 2002

Consulte a su médico.

Para mayor información consulte: <https://www.paxlovideducacion.mx>

PP-C1D-MEX-0304

PMR/PFIZE/6889/0000/2025

1. Información para prescribir PAXLOVID®, LLD_Mex_SmPC_Marzo24_v1.